

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO- TRANSLAMINARE E DI COPERTURA PER VITE, POMODORO E PATATA

PERGADO MZ è un innovativo fungicida antiperonosporico per vite, pomodoro e patata a base di Mandipropamid (mandelammide). Mandipropamid è altamente efficace nei confronti degli Oomiceti fogliari, verso i quali agisce inibendo la germinazione delle zoospore, la crescita del micelio e la sporulazione. Inoltre è dotato di duplice attività, di contatto e citotropica-translaminare e presenta un'elevata affinità per le cere di foglie e frutti, con evidenti vantaggi in termini di resistenza al dilavamento.

L'abbinamento con Mancozeb rende PERGADO MZ particolarmente indicato nei primi trattamenti del ciclo colturale: in viticoltura fino all'allegagione per la protezione di foglie e grappoli, in orticoltura per la protezione della vegetazione della patata e di foglie e bacche nel pomodoro. Grazie alla sua formulazione in granuli idrodispersibili, PERGADO MZ è facile da dosare e sicuro per l'operatore.

FUNGICIDA



Vite



Orticole

COMPOSIZIONE

Mandipropamid 5%
Mancozeb 60%

INDICAZIONI DI PERICOLO

Xn - nocivo
N - pericoloso per l'ambiente

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE

13742 del 19.1.09

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora	200-250	2-2,5	Interventi preventivi al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e, successivamente, ad intervalli di 10-12 giorni. Utilizzare i dosaggi più elevati e gli intervalli più brevi in caso di condizioni meteorologiche favorevoli ad un rapido sviluppo del patogeno	21 gg
Patata <i>(in pieno campo)</i>	Fitoftora	250	2,5	Intervenire in presenza di condizioni sufficienti a determinare l'infezione, continuando ad intervalli di 7-10 giorni	7 gg
Pomodoro <i>(in pieno campo)</i>					3 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Si consiglia di utilizzare PERGADO MZ in programmi di difesa in alternanza alla linea di prodotti RIDOMIL GOLD. In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dalla Peronospora durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture e si previene l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

Per un controllo contemporaneo dell'Oidio miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI o TOPAS 200 EW.

CONFEZIONI

scatole da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi

scatole da **5 kg**
in cartoni da 4 pezzi

sacchi da **10 kg**

